



Kabasólyom (*Falco subbuteo*)

Nyílt területek jellegzetes ragadozómadara. A fészkelési szokása a vörösvércsééhez hasonló, azonban a kabasólyom erdőkben is megtelepszik. Nagyobb rovarokat, apró madarakat, olykor denevért is zsákmányol. Vonuló faj (május-augusztus), a telet Afrikában tölti.

**E MADARAK FENNMARADÁSA CSAKIS
AZ ÖNÖK SEGÍTSÉGÉVEL, KÖZÖS
ÖSSZEFOGÁSSAL VALÓSÍTHATÓ MEG !**

A Milvus Csoport 1995-ben kezdeményezett egy ragadozómadarak kutatására és védelmére irányuló programot. E program különböző védelmi, kutatási és népszerűsítő tevékenységet foglal magába. Sajnos még napjainkban is sok ember ellenszenvel tekint a ragadozómadarakra nem ismervén ezek fontosságát a természetben. E kiadványban a dombvidéken fészkelő leggyakoribb fajokat ismertetjük röviden.

**A világon minden ragadozómadár faj védett,
sokukat a kipusztulás veszélye fenyegeti!**



E kiadvány a csíkszeredai Polgár-Társ Alapítvány támogatásával készült



Partner Szervezet

Dombvidéki nappali ragadozómadaraink



KIADTA A MILVUS CSOPORT
4300 Marosvásárhely, Crinului utca 22 sz.
Tel/fax: 0265-264726; 0740-376628
E-mail: milvus@fx.ro, Web-oldal: www.milvus.ro


A dombvidék kitűnő élőhelyet biztosít számos ragadozómadárfaj számára. Adottságainak köszönhetően az országban talán a legnagyobb ragadozómadár fajbőséggel találkozhatunk itt. Az Erdélyi Medence dombvidékét különböző arányban, mozaikolt nyílt terület és erdős táj jellemzi; az alacsonyabb területeken gyertyános-tölgyes, míg a magasabb dombságon bükkös társulások találhatók. Az erdőtlen, nyitott részeket általában mezőgazdasági területek (hagyományos ill. modern kultúrákkal művelt), legelők, kaszálók, parlagok, valamint a települések és ezeket körbevevő különböző felhasználás alatt álló területek jellemzik.

Az emberi tevékenységnek köszönhetően sajnos egyre jobban szűkülnek az erdőfelületek, de főképp az öreg állományú parcellák eltűnése okozza a nagy problémát.

A monokultúrák és az intenzív mezőgazdaság, további veszélyeztető tényező, ugyanis ezek, növény- és állatfajokban szegény élővilágot eredményeznek. Az Erdélyi Medencében az erdős és erdőtlen területek arányának, valamint ezek minőségének függvényében alakul az itt otthont találó ragadozómadarak száma és fajbősége. Az itt élő leggyakoribb fajokat az alábbiakban ismertetjük röviden.


Egerészölyv (*Buteo buteo*)

A dombvidék leggyakoribb ragadozómadárfaja. Erdőben költ, fészket öreg fára rakja. Vadászni a mezőgazdasági területeket, réteket, kaszálókat és legelőket keresi fel. Tápláléka majdnem kizárólag rágcsálókból áll. Részleges vonuló, az itt fészkelő állomány egy része télen feldúsul az északról érkező madarakkal.




Héja (*Accipiter gentilis*)

Erdőink jellemző ragadozómadara, ahol úgy fészkelési mind táplálkozási feltételei biztosítva vannak. Ritkán az erdőn kívül is vadászik. Tápláléka többnyire madaraktól áll, melyeket röptükben fog el. Leggyakoribb zsákmányállatai a szajkó, a seregély és a különböző galambfajok. Állandó madár, az öregek télen is a fészkelőterület közelében maradnak, a fiatalok kóborolnak.



Darázsölyv (*Pernis apivorus*)

Az előző két fajnál jóval ritkább erdőlakó madár. Öreg fákkal borított erdőállományokban költ, fészket fára rakja. Erdőben, ligetekben és erdőszélen vadászik ahol egy magassabb megfigyelőpontról fedezi fel legfontosabb táplálékállatainak (méhek, darazsak, poszméhek) földbe rejtett fészkeit. Alkalmanként apró madarat is zsákmányol. Vonuló madár, április és szeptember között tartózkodik a fészkelőterületén, a telet Afrikában tölti.



Vörös vércse (*Falco tinnunculus*)

Gyakori ragadozómadarunk, mely a nyílt területek kedvelője. Saját fészket nem épít, szarkák, varjak elhagyott fészkeit foglalja el, néha épületeken is megtelepszik. Fásorokban, magányos fán, ligetekben költ, kerüli a zárt erdőket. Jellegzetes vadászterületei a szántóföldek, legelők, ahol rágcsálókra és nagyobb rovarokra vadászik. Vonuló faj, a telet Dél Európában és Észak Afrikában tölti, egyes példányai áttelelnak.

Békászó sas (*Aquila pomarina*)

Leggyakoribb sasfajunk, Erdélyben igen jelentős állománya maradt fenn. Kizárólag öreg erdőkben költ ahol a közelben nedves réteket, kaszálókat talál. Vadászterületei a mozaikolt szántóföldek, mezőgazdasági területek, rétek, legelők, melyeken rágcsálókra és békákra vadászik. Április elejétől szeptemberig tartózkodik nálunk, telelőterületei Afrikában vannak.

