



Kivonatfüzet

Abstracts

13.

Kolozsvári

Biológus Napok

13th Biology Days

Kolozsvár

Cluj-Napoca

2012

március 30–31.



Kiselőadások

Emlősfajok védelme a Natura 2000 hálózat segítségével Romániában

Kecskés Attila*, Hegyeli Zsolt, Hana Latková, Sos Tibor, Nagy András Attila, Domokos Csaba, Aczél-Fridrich Zsuzsanna, Mezey Zsófia, Sugár Szilárd, Papp Tamás

***„Milvus Csoport” Madártani és Természetvédelmi Egyesület,**

attila.kecskes@milvus.ro

A Natura 2000 az Európai Unió egyik fő természetvédelmi eszköze, célja a biológiai sokféleség megőrzése a tagállamok területén, védett terület-hálózatok kialakításával és azok kezelésével. Élőhelyvédelmi Irányelvének 2. függelékében 27, Romániában vadon előforduló emlősfajt sorol fel, melyek fennmaradását az állam védett területek kijelölésével köteles biztosítani. E feladat teljesítésére Románia többször haladékot kapott, hisz elavult, régi faunisztikai adatokra hagyatkozva és új adatok hiányában lehetetlen volt ennek eleget tenni. A kormány 2007 novemberében jelölte ki a Natura 2000 hálózatát és ennek részeként 273 Közösségi Jelentőségű Területet (SCI-t), melyeknek nagy hányada emlősfajok (26 faj) megőrzésére is volt jelölve. A nagy késéssel, 2011 őszén benyújtott új állami javaslatcsomag 135 új SCI-t tartalmazott, melybe a civil szféra által emlősök védelmére javasolt területeknek kevesebb, mint 10%-a került be. Ezáltal egyes fajok (pl. medve, vidra, ürge) esetében jelentősen javult a védett területek hálózata, másoké viszont szinte nem változott. A civil javaslatok hátterében több hazai szervezetnek a „Milvus Csoport” Madártani és Természetvédelmi Egyesület irányításával végzett munkája állt. Ennek részeként csaknem 4000 km folyószakasz különböző élőhelytípusait jártuk be 2009–2010-ben, melynek során felmértük a vidraállományt az IUCN Minimum Standard módszerével, adatokat gyűjtöttünk a hód elterjedéséről és több folyómenti ürge legelő azonosításával kiegészítettük a 2006 és 2010 között végzett, országos szintű ürgefelmérés eredményeit. A csíkos szöcskeegér és a dobudzsai hörcsög előfordulási adatait a folyamatosan végzett bagoly- és ragadozómadár köpetelemzések, a molnárgeréze új előfordulásait, pedig az elűtött állatok vizsgálata révén sikerült jelentősen kiegészíteni. A nagyragadozók számára potenciális összekötő területeket valamint az erdélyi dombvidéken több, a medve szempontjából fontos területet azonosítottunk.

Conservation of mammal species in Romania through the Natura 2000 network

Natura 2000 is a major conservation tool of the European Union, aiming to conserve biodiversity in member states, through the designation and management of a protected area network. In Annex 2. of the Habitats Directive 27 mammal species occurring in Romania are listed, the survival of which must be ensured through the designation of protected areas. Romania's fulfillment of this task has been delayed several times, being impossible to meet in lack of recent faunistic data. In November 2007, 273 Sites of Community Importance (SCIs) were designated as part of the Natura 2000 network, with a high proportion of sites designated also for mammals (26 species). After a long delay, the fall of 2011 brought a new governmental proposal, which included 135 additional SCIs. This package, however, contained less than 10% of the NGO proposals for mammal conservation. Thus, in case of some species (e.g. brown bear, otter, European ground squirrel) the network has improved considerably, while for others it remained almost unchanged. NGO proposals were based on the work of several organizations, with the coordination of "Milvus Group" Bird and Nature Protection Association. As part of this, almost 4000 km of river section have been surveyed, during which otter surveys have been conducted using the IUCN Minimum Standard Method, and data have been collected about beaver distribution and ground squirrel habitats in river valleys. Distribution data of southern birch mouse and Romanian hamster have been significantly supplemented through the continuous owl and raptor pellet analyses, while those of steppe polecat through roadkill surveys. Potential corridors for large carnivore conservation, as well as important areas for brown bears have been identified.