




Efectivele de iernare a păsărilor răpitoare din România în perioada 2006-2017

Kovács István

Asociația Grupul Milvus



Prezentarea programului


Programul „Monitorizarea efectivelor de iernare a păsărilor răpitoare” a fost lansat în 2006 de Grupul Milvus

Metodologie:

- Un traseu de minim 5 km parcursă pe jos de 2 ori pe iarnă în Decembrie și Februarie
- Trebuie numărate păsările răpitoare de zi și sfrânciocul mare



Numărul traseelor




155 trasee, 115 repetate, distribuție concentrată în Transilvania și Iași

Numărul traseelor




Puține trasee cu multe vizite


Numărul traseelor




Număr total păsări răpitoare




Numărul de specii




Diferențe dintre regiuni - *Buteo buteo*




Diferențe dintre regiuni - *Buteo buteo*




Diferențe dintre regiuni - *Buteo lagopus*




Diferențe dintre regiuni - *Buteo lagopus*



Diferențe dintre regiuni – *Circus cyaneus*







Diferențe dintre regiuni – *Circus cyaneus*









Diferențe dintre regiuni – *Aquila clanga*





Diferențe dintre sesiuni



Tendințe populaționale – *Buteo buteo*



Tendențe populaționale – Alte specii



Circus cyaneus (alte regiuni), *Accipiter nisus*, *Accipiter gentilis*, *Buteo lagopus*, *Falco tinnunculus*: **tendință stabilă sau incertă**

Mulțumim voluntarilor!

Vă așteptăm în program!

