

vânatul. Acesta a constituit doar o parte a acțiunilor nesăbuite ale omului care au afectat serios populația păsărilor răpitoare diurne. Utilizarea pesticidelor în agricultură (DDT) și silvicultură a contribuit și ea în bună măsură la scăderea drastică a efectivelor unor specii care se hrăneau mai

ales cu rozătoare și mamifere mici. Nu în ultimul rând pagube importante au fost produse de braconieri și colecționari de ouă a căror acțiuni dăunătoare la cuiburi au contribuit în bună măsură la distrugerea acestor minunate păsări.

## ÎN ROMÂNIA VÂNATUL PĂSĂRILOR RĂPITOARE ESTE INTERZISĂ PRIN LEGE !

Azi trebuie să reconsiderăm rolul păsărilor răpitoare diurne în menținerea echilibrului ecologic și trebuie să depunem eforturi deosebite pentru a proteja acele specii a căror efective sunt în scădere. În primul rând trebuie să aflăm care sunt problemele actuale care amenință păsările răpitoare care cuibăresc în România, iar după aceea să

dezvoltăm programe de protecție efectivă adaptate la nevoile fiecărei specii.

Nu uitați! Numai cu ajutorul Dvs. putem acționa cu succes în scopul protejării și salvării acestor adevărate monumente ale naturii.

Grupul Milvus - filiala din Tg.-Mureș a Societății Ornitologice Române desfășoară în prezent un program de recensământ al păsărilor răpitoare diurne. Vă puteți implica și Dvs. dacă ne

trimiteți orice date despre aceste specii sau participând direct la activitățile noastre. Pentru detalii despre proiect vă rugăm să ne scrieți la adresa grupului. Vă mulțumim!


# 2000

---

## ANUL PROTECȚIEI ACVILEI DE CÂMP ÎN ROMÂNIA!

Publicație editată de grupul Milvus - filiala S.O.R., cu sprijinul British Ornithologists Union  
Sediul: str. Belșugului nr. 35, 4300 Tg.-Mureș  
Adresă poștală: Op. 3, Cp. 39, 4300 Tg.-Mureș, România  
Telefon: +40 (0)65 164726  
E-mail: milvus@netsoft.ro  
Web site: www.netsoft.ro/milvus

# SĂ PROTEJĂM PĂSĂRILE RĂPITOARE DIURNE!



împreună pentru păsări





**P**ăsările răpitoare de zi constituie un grup bine individualizat de specii. Deși cunoaștem și alte păsări care consumă "hrană vie" (de exemplu familia

Laniidae și altele) răpitoarele diurne sunt cele care întruchipează aspectul unui adevărat prădător : ochi ageri, aripi puternice, cioc încovoiat la vârf și gheare lungi și ascuțite. Toate acestea le ajută în capturarea și sfâșierea pradei.

În continuare v-om discuta despre câteva aspecte legate de viața și comportamentul păsărilor răpitoare diurne.

## CUIBUL RĂPITOARELOR

Deosebim două tipuri de păsări, și anume:

■ cele care își construiesc singure cuibul unde vor depune ouăle și vor crește puii (ulii, acvilele, șorecarul etc.). Aceste păsări folosesc cuibul construit mai mulți ani la rând sau în caz de deteriorare a cuibului pot construi altul în apropiere. Arealul acestor păsări este foarte întins în cazul unor specii.



■ șoimii și vinderei sunt specii care ocupă cuibul altor păsări, în special cuibul speciilor din familia Corvidae, acestea urmăresc de obicei coloniile mixte

de ciori unde cuibăresc în colonii mai mari sau de dimensiuni mai reduse. De multe ori însă ele cuibăresc și individual sau ocazional ocupă cuibul abandonat al unor alte păsări răpitoare.

Păsările răpitoare diurne de cele mai

multe ori cuibăresc în copaci, dar ele își pot amenaja cuibul și în crăpături de stânci, scorburi naturale și artificiale, pe pământ sau chiar și pe acoperișul unor clădiri înalte.

## HRANA RĂPITOARELOR

Există câteva caracteristici care individualizează unele specii de răpitoare, și anume:

■ răpitoare care se hrănesc cu hoituri, ba chiar cu oase (zăganul). Din păcate aceste păsări au dispărut din avifauna României datorită intervenției nesăbuite a omului.

■ răpitoare care se hrănesc cu mamifere și păsări cântătoare, aici fiind incluse marea majoritate a speciilor întâlnite în țară (acvilele, ulii, șoimii)

■ răpitoare specializate pe insecte, larve, pește

etc. (viesparul, vânturelul de seară, uliganul pescar)



## MIGRAȚIA RĂPITOARELOR

Deosebim mai multe tipuri de păsări, și anume:

■ răpitoare sedentare care își petrec tot timpul la noi în țară (ulii, acvila de munte)

■ răpitoare care cuibăresc la noi și o parte din ei rămân tot timpul în țară, iar o parte migrează spre sud (acvila de câmp, vânturel roșu,

șorecarul etc.)

■ răpitoare care sunt oaspeți de vară sau de iarnă (viesparul, șerparul, gaiele, respectiv șorecarul încălțat)

■ răpitoare care se pot observa foarte rar, sau doar în timpul pasajului (acvila porumbacă, acvila țipătoare mare, uligan pescar)

## SITUAȚIA SPECIILOR ÎN ROMÂNIA

Dealungul timpului în România s-au identificat 37 specii de răpitoare diurne. Din păcate în zilele noastre unele au dispărut, iar câteva sunt și în prezent amenințate de pericolul dispariției.

Din nefericire în anii 50-60 organele silvice și de vânatoare au dus o campanie intensă de combatere a păsărilor răpitoare deoarece considerau că afectează

